



# Traumeel®

## Comprimidos

Uso veterinário

### Produto importado

**Medicamento homeopático para a regulação de condições inflamatórias. Seu efeito sinérgico multi-alvo atua em vários locais da reação inflamatória e apoia a resolução e o processo de cicatrização.**

### Fórmula

#### Cada comprimido (301,5 mg) contém:

Substancia Ativa	Potência	Quantidade
Achillea millefolium	D3	15,0 mg
Aconitum napellus	D3	30,0 mg
Atropa bella-donna	D4	75,0 mg
Bellis perennis	D3	6,0 mg
Calendula officinalis	D3	15,0 mg
Echinacea	D3	6,0 mg
Echinacea purpurea	D3	6,0 mg
Hamamelis virginiana	D3	15,0 mg
Hepar sulfuris	D8	30,0 mg
Matricaria recutita	D3	24,0 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni	D8	30,0 mg
Symphytum officinale	D8	24,0 mg
Arnica montana	D3	15,0 mg
Hypericum perforatum	D2	3,0 mg
Excipiente Q.S.P		301,5 mg

Este produto contém Lactose

### Indicações:

O Traumeel Comprimidos é um medicamento veterinário homeopático indicado para Bovinos, Equinos e Asininos, Suínos, Ovinos e Caprinos, Caninos e Felinos.

Para o tratamento de lesões, feridas, claudicação, distensão, contusões, hematomas, redução da dor, pós-operatório; processos inflamatórios do sistema musculoesquelético, como artrite, tendovaginite e bursite.

Tratamento de suporte em condições inflamatórias de vários locais como flegmão, abscessos, dermatite e mastite.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

### Posologia e modo de usar:

**Somente uso oral.**

**Dose de acordo com as espécies e peso:**

**Bovinos (mais de 500 kg):** 10 comprimidos

**Bovinos (até 500 kg):** 6 a 8 comprimidos

**Equinos e Asininos (mais de 500 kg):** 10 comprimidos

**Equinos e Asininos (até 500 kg):** 6 a 8 comprimidos

**Suínos:** 4 comprimidos

**Ovinos e Caprinos:** 3 a 4 comprimidos

**Caninos (acima de 25 kg):** 3 comprimidos

**Caninos (15-25 kg):** 2 comprimidos

**Caninos (até 15 kg):** 1 comprimido

**Felinos:** 1 comprimido

Ou conforme indicação do médico veterinário.

### Tratamento padrão:

Administrar a dose 2 a 3 vezes ao dia.

### Tratamento agudo / inicial:

Em condições agudas, a dose pode ser inicialmente repetida a cada meia hora a uma hora, por um período de até 2 horas e em seguida, voltar a tratamento padrão.

### Tratamento de longo prazo e doenças crônicas:

Administrar a dose em intervalos de 1 a 4 dias.

### Efeitos adversos:

Nenhum conhecido.

Se notar algum efeito secundário, mesmo que não esteja listado nesta bula, ou se acha que o medicamento não funcionou, por favor, informe o seu médico veterinário.

### Advertências especiais:

Se os sintomas persistirem ou piorarem, consulte um médico veterinário.

Em casos de prenhes ou aleitamento, assim como todos os medicamentos, só deve ser utilizado após consulta com o médico veterinário.

### Interação medicamentosa:

Nenhum conhecido.

Sempre informe o médico veterinário se o seu animal estiver utilizando outros medicamentos.

### Precauções especiais de eliminação do medicamento não utilizado ou dos seus resíduos:

Os medicamentos não devem ser descartados na canalização ou no lixo doméstico.



**-Heel Vet**