



090272/5001/BR



# Traumeel®

Solução Injetável

Medicamento homeopático para a regulação de condições inflamatórias. Seu efeito sinérgico multi-alvo atua em vários locais da reação inflamatória e apoia a resolução e o processo de cicatrização.

## Uso veterinário

## Fórmula

### Cada ampola com 5 g contém:

Substância ativa

Achillea millefolium

Aconitum napellus

Arnica montana

Atropa bella-donna

Bellis perennis

Calendula officinalis

Echinacea angustifolia

Echinacea purpurea

Hamamelis virginiana

Hypericum perforatum

Matricaria recutita

Symphytum officinale

Hepar sulfuris

Mercurius solubilis Hahnemanni

Veículo Q.S.P

Potências

D 5

D 4

D 4

D 4

D 4

D 4

D 4

D 4

D 4

D 4

D 5

D 8

D 6

D 8

5 g

## Indicações

Traumeel é um medicamento veterinário homeopático indicado para bovinos, equinos, asininos, caprinos, ovinos e suínos. Caninos, felinos, coelhos e aves ornamentais

Para o tratamento de lesões, feridas, claudicação, distensão, contusões, hematomas, redução da dor, pós-operatório; processos inflamatórios do sistema musculoesquelético, como artrite, tendovaginite e bursite.

Tratamento de suporte em condições inflamatórias de vários locais como flegmão, abscessos, dermatite e mastite.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

## Posologia e modo de usar

### Solução Injetável

Dosagem de acordo com as espécies e peso:

**Bovinos (mais de 500 kg):** 10 mL

**Bovinos (até 500 kg):** 5 mL

**Equinos e Asininos (mais de 500 kg):** 10 mL

**Equinos e Asininos (até 500 kg):** 5 mL

**Suínos:** 3-5 mL

**Ovinos e Caprinos:** 3-4 mL

**Caninos (acima de 25 kg):** 3-4 mL

**Caninos (15-25 kg):** 2 mL

**Caninos (até 15 kg):** 1-2 mL

**Felinos:** 1-2 mL

**Animais de pequeno porte (por exemplo coelhos, aves ornamentais):** 0,5 mL ou conforme indicação do médico veterinário.

### Tratamento padrão:

Administrar a dose 1x por dia.

### Tratamento agudo / inicial:

Em condições agudas, a dose pode ser inicialmente repetida após 12 horas, continuando posteriormente com o tratamento padrão.

### Tratamento de longo prazo e doenças crônicas:

Administrar a dose em intervalos de 1 a 4 dias.

**Pode ser administrado por via subcutânea, intra-articular, intramuscular e endovenosa**

### Instruções para abrir o frasco de vidro (ampola):

Manuseie com cuidado. Siga as instruções de abertura cuidadosamente. Não é necessário cortar a ampola de vidro.

-Heel Vet

