



094115/5000/BR

Zeel®

Solução Injetável

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS ARTICULARES, ESPECIALMENTE DO TIPO CRÔNICO-DEGENERATIVAS, POR EXEMPLO ARTROSE. PRINCIPALMENTE NAS ARTICULAÇÕES DO QUADRIL, JOELHO, OMBRO E COTOVELO. ESPONDILULOSE, ESPONDILARTROSE, PROLAPSO DE DISCO E APÓS OPERAÇÕES ARTICULARES.

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada ampola com 5 g contém:

Ingrediente Ativo	Potencia	Quantidade
Acidum thiocticum	D8	5,0 mg
Arnica montana	D3	50,0 mg
Cartilago suis	D6	5,0 mg
Coenzym A	D8	5,0 mg
Embryo totalis suis	D6	5,0 mg
Funiculus umbilicalis suis	D6	5,0 mg
Nadidum	D8	5,0 mg
Natrium diethyloxalacetikum	D8	5,0 mg
Placenta totalis suis	D6	5,0 mg
Rhus toxicodendron	D2	25,0 mg
Sanguinaria canadensis	D4	7,5 mg
Solanum dulcamara	D3	25,0 mg
Sulfur	D6	9,0 mg
Symphytum officinale	D6	25,0 mg
Veículo Q.S.P		5 g

INDICAÇÕES:

O Zeel Solução Injetável é um medicamento veterinário homeopático indicado para bovinos, equinos, asininos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Caninos, Felinos e animais de pequeno porte (Por exemplo: pequenos roedores e aves ornamentais)

Para o tratamento de doenças articulares, especialmente do tipo crônico-degenerativas, por exemplo artrose. Principalmente nas articulações do quadril, joelho, ombro e cotovelo. Espondilose, espondilartrose, prolapso de disco e após operações articulares.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Solução Injetável

Dosagem de acordo com as espécies e peso:

Bovinos (mais de 500 kg): 10 mL

Bovinos (até 500 kg): 5 mL

Equinos e Asininos (mais de 500 kg): 10 mL

Equinos e Asininos (até 500 kg): 5 mL

Suínos: 3-5 mL

Ovinos e Caprinos: 3-4 mL

Caninos (acima de 25 kg): 3-4 mL

Caninos (15-25 kg): 2 mL

Caninos (até 15 kg): 1-2 mL

Felinos: 1-2 mL

Animais de pequeno porte (por exemplo, pequenos roedores e aves ornamentais acima de 0,5 kg): 0,5 mL

Animais de pequeno porte (por exemplo, pequenos roedores e aves ornamentais até 0,5 kg): 0,05 até: 0,5 mL

Ou conforme indicação do médico veterinário.

Tratamento padrão:

Administrar a dose 1x por dia.

Tratamento agudo / inicial:

Em condições agudas, a dose pode ser inicialmente repetida após 12 horas, continuando posteriormente com o tratamento padrão.

Tratamento de longo prazo e doenças crônicas:

Administrar a dose em intervalos de 1 a 4 dias.

Pode ser administrado por via subcutânea, intra-articular, intramuscular e intravenosa.

Instruções para abrir o frasco de vidro (ampola):

Manuseie com cuidado. Siga as instruções de abertura cuidadosamente. Não é necessário cortar a ampola de vidro.



-Heel Vet

