

Ubichinon

Solução Injetável

MEDICAMENTO VETERINÁRIO HOMEOPÁTICO, PARA A REGENERAÇÃO DO METABOLISMO CELULAR, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES CRÔNICAS OU DEGENERATIVAS E DOENÇAS TUMORAIS (NEOPLASIAS).

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada ampola com 2,2 g contém:

Ingrediente Ativo

Acidum acetylsalicylicum	10 DH
Acidum ascorbicum	6 DH
Acidum Lacticum	6 DH
Adenosinum triphosphoricum	10 DH
Anthrachinonum	10 DH
Coenzym A	10 DH
Conium maculatum	4 DH
Galium aparine	6 DH
Histaminum	10 DH
Hydrastis canadensis	4 DH
Hydrochinonum	8 DH
Magnesium gluconicum	10 DH
Nadidum	10 DH
Naphthochinonum	10 DH
Natrium riboflavinum phosphoricum	6 DH
Nicotinamidum	6 DH
Benzochinonum	10 DH
Podophyllum peltatum	4 DH
Pyridoxinum hydrochloricum	6 DH
Sulfur	8 DH
Thiaminum hydrochloricum	6 DH
Trichinoylum	10 DH
Ubidecarenonum	10 DH
Vaccinium myrtillus	4 DH
Acidum thiocticum	8 DH
Manganum phosphoricum	8 DH
Natrium diethyloxalaceticum	8 DH
Veículo Q.S.P	

INDICAÇÕES

Ubiquinon Solução Injetável é medicamento veterinário homeopático indicado para Bovinos, Equinos, Asininos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Caninos, Felinos e animais de pequeno porte (por exemplo, pequenos roedores, coelhos, pássaros ornamentais).

Para a regeneração do metabolismo celular, especialmente em condições crônicas ou degenerativas e doenças tumorais (neoplasias).

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Solução Injetável

Dosagem de acordo com as espécies e peso:

Bovinos (mais de 500 kg): 10 mL

Bovinos (até 500 kg): 5 mL

Equinos e Asininos (mais de 500 kg): 10 mL

Equinos e Asininos (até 500 kg): 5 mL

Suínos: 3-5 mL

Ovinos e Caprinos: 3-4 mL

Caninos (acima de 25 kg): 3-4 mL

Caninos (15-25 kg): 2 mL

Caninos (até 15 kg): 1-2 mL

Felinos: 1-2 mL

Animais de pequeno porte (por exemplo, pequenos roedores e aves ornamentais acima de 0,5 kg): 0,5 mL.

Animais de pequeno porte (por exemplo, pequenos roedores e aves ornamentais até 0,5 kg): 0,05 até 0,5 mL.

Ou conforme indicação do médico veterinário.

Tratamento padrão:

Administrar a dose 1x por dia.

-Heel Vet

Tratamento agudo / inicial:

Em condições agudas, a dose pode ser inicialmente repetida após 12 horas, continuando posteriormente com o tratamento padrão.


Tratamento de longo prazo e doenças crônicas:

Administrar a dose em intervalos de 1 a 4 dias.

Pode ser administrado por via subcutânea, intramuscular e intravenosa.

Instruções para abrir o frasco de vidro (ampola):

Manuseie com cuidado. Siga as instruções de abertura cuidadosamente. Não é necessário cortar a ampola de vidro.



Mantenha sempre o ponto colorido da ampola para cima. Faça o líquido eventualmente contido na parte superior da ampola passar para a parte inferior por meio de movimentos circulares.

Segurando firmemente o corpo da ampola em uma mão, aplique com a outra mão uma força sobre a parte superior, em direção contrária ao ponto (ou seja, para baixo), até o rompimento do gargalo da ampola. Qualquer conteúdo restante deve ser descartado.

EFEITOS ADVERSOS

Nenhum conhecido.

Se notar algum efeito secundário, mesmo que não esteja listado neste folheto informativo, ou se acha que medicamento não funcionou, por favor, informe o seu médico veterinário.

CONSELHOS PARA UMA ADMINISTRAÇÃO CORRETA

A injeção deste medicamento só deve ser realizada por um veterinário ou outra pessoa com proficiência suficiente na técnica correta de injeção.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

Se os sintomas persistirem ou piorarem, consulte um médico veterinário.

Em casos de prenhes, aleitamento ou postura, assim como em todos os medicamentos, só deve ser utilizado após consulta com o médico veterinário.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA

Nenhum conhecido.

Sempre informe o médico veterinário se o seu animal estiver utilizando outros medicamentos.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS RESÍDUOS

Os medicamentos não devem ser descartados na canalização ou no lixo doméstico.

CONTRAINDICAÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO

Não administrar a animais com hipersensibilidade conhecida a um dos ingredientes.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS, EQUINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS.

ABATE – CARÊNCIA ZERO.

LEITE – CARÊNCIA ZERO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONCENTRAÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA CONSUMO.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO

Conservar a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), em local seco, fresco e ao abrigo da luz, longe das crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

APRESENTAÇÕES

Frasco ampola de 2,2 mL em embalagem com 5,10, 50 e 100 unidades.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Alemanha

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

UNA UNIÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO LTDA.
Rua Antônio Moro, 340c
CEP 83010-300 - São José dos Pinhais – PR –
Fone: (41) 3333-7920
E-mail: una@unaagropecuaria.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Elisangela Maria Negoseki Dombroski
CRMV/PR 14733

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o número 191/2024 em 14/01/2025

PARTIDA E FABRICAÇÃO

VIDE RÓTULO DO FRASCO / VENCIMENTO: 5 anos após a data de fabricação.

PRODUTO IMPORTADO DA ALEMANHA.