



Zeel®

Solução Injetável

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS ARTICULARES, ESPECIALMENTE DO TIPO CRÔNICO-DEGENERATIVAS, POR EXEMPLO ARTROSE. PRINCIPALMENTE NAS ARTICULAÇÕES DO QUADRIL, JOELHO, OMBRO E COTOVELO. ESPONDILOSE, ESPONDILARTROSE, PROLAPSO DE DISCO E APÓS OPERAÇÕES ARTICULARES.

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada ampola com 5 g contém:

Ingrediente Ativo Potencia Quantidade

Acidum thiocticum	D8	5,0 mg
Arnica montana	D3	50,0 mg
Cartilago suis	D6	5,0 mg
Coenzym A	D8	5,0 mg
Embryo totalis suis	D6	5,0 mg
Funiculus umbilicalis suis	D6	5,0 mg
Nadidum	D8	5,0 mg
Natrium diethyloxalacetikum	D8	5,0 mg
Placenta totalis suis	D6	5,0 mg
Rhus toxicodendron	D2	25,0 mg
Sanguinaria canadensis	D4	7,5 mg
Solanum dulcamara	D3	25,0 mg
Sulfur	D6	9,0 mg
Symphytum officinale	D6	25,0 mg
Veículo Q.S.P		5 g

INDICAÇÕES:

O Zeel Solução Injetável é um medicamento veterinário homeopático indicado para bovinos, equinos, asininos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Caninos, Felinos e animais de pequeno porte (Por exemplo: pequenos roedores e aves ornamentais)

Para o tratamento de doenças articulares, especialmente do tipo crônico-degenerativas, por exemplo artrose. Principalmente nas articulações do quadril, joelho, ombro e cotovelo. Espondilose, espondilartrose, prolapso de disco e após operações articulares.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Solução Injetável

Dosagem de acordo com as espécies e peso:

Bovinos (mais de 500 kg): 10 mL

Bovinos (até 500 kg): 5 mL

Equinos e Asininos (mais de 500 kg): 10 mL

Equinos e Asininos (até 500 kg): 5 mL

Suínos: 3-5 mL

Ovinos e Caprinos: 3-4 mL

Caninos (acima de 25 kg): 3-4 mL

Caninos (15-25 kg): 2 mL

Caninos (até 15 kg): 1-2 mL

Felinos: 1-2 mL

Animais de pequeno porte (por exemplo, pequenos roedores e aves ornamentais acima de 0,5 kg):
0,5 mL

Animais de pequeno porte (por exemplo, pequenos roedores e aves ornamentais até 0,5 kg):
0,05 até: 0,5 mL

Ou conforme indicação do médico veterinário.

Tratamento padrão:

Administrar a dose 1x por dia.

Tratamento agudo / inicial:

Em condições agudas, a dose pode ser inicialmente repetida após 12 horas, continuando posteriormente com o tratamento padrão.

Tratamento de longo prazo e doenças crônicas:

Administrar a dose em intervalos de 1 a 4 dias.



Pode ser administrado por via subcutânea, intra-articular, intramuscular e intravenosa.

Instruções para abrir o frasco de vidro (ampola):

Manuseie com cuidado. Siga as instruções de abertura cuidadosamente. Não é necessário cortar a ampola de vidro.



-Heel Vet



Mantenha sempre o ponto colorido da ampola para cima. Faça o líquido eventualmente contido na parte superior da ampola passar para a parte inferior por meio de movimentos circulares.

Segurando firmemente o corpo da ampola em uma mão, aplique com a outra mão uma força sobre a parte superior, em direção contrária ao ponto (ou seja, para baixo), até o rompimento do gargalo da ampola.

Qualquer conteúdo restante deve ser descartado.

EFEITOS ADVERSOS

Nenhum conhecido.

Se notar algum efeito secundário, mesmo que não esteja listado neste folheto informativo, ou se acha que medicamento não funcionou, por favor, informe o seu médico veterinário.

CONSELHOS PARA UMA ADMINISTRAÇÃO

A injeção deste medicamento só deve ser realizada por um veterinário ou outra pessoa com proficiência suficiente na técnica correta de injeção.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

Se os sintomas persistirem ou piorarem, consulte um médico veterinário.

Em casos de prenhes, aleitamento ou postura, assim como em todos os medicamentos, só deve ser utilizado após consulta com o médico veterinário.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA

Nenhum conhecido.

Sempre informe o médico veterinário se o seu animal estiver utilizando outros medicamentos.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS RESÍDUOS

Os medicamentos não devem ser descartados na canalização ou no lixo doméstico.

CONTRAINDICAÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO

Não administrar a animais com hipersensibilidade conhecida a um dos ingredientes.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS, EQUINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS.
ABATE – CARÊNCIA ZERO.
LEITE – CARÊNCIA ZERO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONCENTRAÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA CONSUMO.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO

Conservar a temperatura ambiente (8 °C a 30 °C), em local seco, fresco e ao abrigo da luz, longe das crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MEDICO VETERINÁRIO

APRESENTAÇÕES

Frasco ampola de 5 mL em embalagem com 5 e 50 unidades

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Alemanha

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

UNA UNIÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO LTDA.
Rua Antônio Moro, 340c
CEP 83010-300 - São José dos Pinhais- PR –
Fone: (41) 3333-7920
E-mail: una@unaagropecuaria.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Elisangela Maria Negoseki Dombroscki
CRMV/PR 14733

Licenciado no Ministério da Agricultura, sob o nº 109/2024 em 07/05/2024.

PARTIDA E FABRICAÇÃO:

VIDE RÓTULO DO FRASCO / VENCIMENTO:
XX anos após a data de fabricação.

PRODUTO IMPORTADO DA ALEMANHA.